

Pirazinamida (oral)

Información sobre el medicamento

La PIRAZINAMIDA (peer-ra-ZIN-ah-mide, pronunciación en inglés) se utiliza para tratar la tuberculosis (TB). Se la utiliza junto con uno o más medicamentos para la TB.

Antes de utilizar este medicamento

Informe a su médico, enfermera o farmacéutico si:

- sufre de alergias;
- está embarazada o planea quedar embarazada;
- está amamantando a un bebé;
- toma otros medicamentos recetados, entre otros, píldoras anticonceptivas y diluyentes de la sangre;
- toma cualquier medicamento de venta libre, tales como, medicamentos para el resfrío y calmantes (Tylenol[®], Advil[®], Motrin[®], aspirina);
- sufre algún otro problema médico, como diabetes, gota, enfermedades hepáticas, enfermedades renales o consume alcohol.

Tome este medicamento:

- exactamente como se lo indicó su médico y NO deje de hacerlo hasta que se lo indiquen, aun cuando se sienta mejor;
- con alimentos o leche si le produce malestar estomacal.

Advertencias

- No se olvide de ninguna dosis. Si lo hace, tómela tan pronto como lo recuerde. Saltee la dosis olvidada si es casi el horario de la dosis siguiente programada. NO tome dos dosis al mismo tiempo.
- No comparta el medicamento con otros.

- Mantenga este y todo otro medicamento fuera del alcance de los niños.
- Visite a su médico periódicamente.
- Guarde el medicamento en un lugar seco y fresco, alejado del frío o calor extremo.
- Si cree haber ingerido una sobredosis de este medicamento, consulte a su médico. Restrinja el consumo de bebidas alcohólicas mientras esté tomando este medicamento para evitar posibles problemas hepáticos. Además, el alcohol puede disminuir la eficacia del medicamento.

Posibles efectos secundarios de este medicamento

- náuseas, vómito o pérdida del apetito
- cansancio inusual

Llame a su médico si presenta alguno de los siguientes efectos secundarios POCO COMUNES:

- erupción cutánea, picazón fuerte o urticaria
- dolor o hinchazón de las articulaciones o músculos
- fiebre o escalofríos
- color amarillento de la piel o de los ojos
- orina de color oscuro
- aumento de la sensibilidad de la piel a la luz solar

Reproducido, con autorización, de la United States Pharmacopeial Convention, Inc., 1989-2003. Impreso en marzo de 2003 por el Department of Nursing de la University of Wisconsin Hospitals and Clinics Authority, Madison, WI. Revisado por el Department of Pharmacy. UWH # 5880